

# Cataflam

## Emulgel®

### diclofenaco dietilamônio



Gel tópico. Bisnagas com 30 g, 60 g ou 100 g.

#### USO ADULTO

##### Composição:

Cada 100 g de CATAFLAM EMULGEL contém 1,16 g de diclofenaco dietilamônio, equivalentes a 1,05 g de diclofenaco potássico.

**Excipientes:** dietilamina, carbômer, cetomacrogol 1000, álcool isopropílico, propilenoglicol, parafina líquida, perfume, coco-caprilato-caprato e água purificada.

##### Como este medicamento funciona?

CATAFLAM EMULGEL é um medicamento antiinflamatório tópico que age sobre a região inflamada aliviando o inchaço e a dor. A formulação do medicamento foi desenvolvida especialmente para ser friccionada sobre a pele. A substância ativa, o diclofenaco dietilamônio, pertence ao grupo dos medicamentos chamados anti-inflamatórios não-esteroidais.

##### Porque este medicamento foi indicado?

CATAFLAM EMULGEL foi indicado para aliviar a dor e reduzir os sintomas da inflamação como inchaço e dor, nas seguintes condições:

- Entorses, lesões, contusões, distensões, torcicolo, dores nas costas, dor muscular, dor pós-traumática, lesões causadas pela prática esportiva;
- Tendinite, cotovelo do tenista, bursite;
- Alguns tipos de artrites leves (artralgia, dor articular) nos joelhos e dedos.

CATAFLAM EMULGEL também pode ser usado para tratar outras condições determinadas por um médico.

##### Quando não devo usar este medicamento?

###### Contra-indicações:

Não use CATAFLAM EMULGEL se:

- Você já tiver apresentado alguma reação alérgica ao diclofenaco ou a outro medicamento utilizado para o tratamento de dor, febre ou inflamação, tais como o ibuprofeno ou ácido acetilsalicílico (substância também utilizada para prevenir a coagulação sanguínea). Os sintomas de uma reação alérgica a essas substâncias podem incluir: asma, respiração ofegante, erupção cutânea ou urticária, inchaço da face ou da língua, nariz gotejante.
- Você for alérgico a propilenoglicol, álcool isopropílico ou à qualquer outro ingrediente da formulação. O propilenoglicol pode causar, em algumas pessoas, uma leve irritação localizada na pele. Este medicamento é contra-indicado para crianças menores de 14 anos.

##### Advertências:

- Não aplique CATAFLAM EMULGEL em superfícies descascadas da pele ou em feridas e escoriações abertas, ou dentro da boca ou vagina.
- Tenha cuidado para não aplicar CATAFLAM EMULGEL em seus olhos. Se isto ocorrer, lave-os com água limpa e procure um médico, se o desconforto persistir.
- CATAFLAM EMULGEL deve ser utilizado somente para uso externo. Não utilize dentro da boca. CATAFLAM EMULGEL não deve ser ingerido.

CATAFLAM EMULGEL não é indicado para crianças abaixo de 14 anos, exceto nos casos de artrite juvenil crônica.

##### Precauções:

###### Gravidez e amamentação:

Não utilize CATAFLAM EMULGEL se você estiver grávida ou estiver amamentando. Procure a orientação de um médico caso você necessite tomar qualquer medicamento.

###### Uso em crianças:

Não é recomendado o uso de CATAFLAM EMULGEL em crianças com idade inferior a 14 anos, exceto nos casos de artrite juvenil crônica.

###### Interações medicamentosas:

Até o momento não foram constatadas interações medicamentosas com o uso de CATAFLAM EMULGEL.

Em caso de dúvida, procure um médico.

**Informe ao seu médico o aparecimento de reações indesejáveis.**

**Informe ao seu médico se você está fazendo uso de algum outro medicamento.**

##### Como devo usar este medicamento?

###### Aspecto físico:

CATAFLAM EMULGEL é um gel homogêneo, possui suave efeito refrescante, não é gorduroso e não mancha.

###### Características Organolépticas:

Gel branco a praticamente branco, com odor característico.

###### Dosagem:

CATAFLAM EMULGEL deve ser aplicado massageando suavemente a pele e cobrindo a área inchada ou dolorida, 3 a 4 vezes ao dia. A quantidade apropriada poderá variar dependendo do tamanho da área afetada. Você notará um leve efeito refrescante quando você massagear o produto na área afetada.

###### Como usar:

Quando for utilizar o produto pela primeira vez, encaixe a parte superior da tampa no lacre da bisnaga e gire no sentido horário. Lave suas mãos após cada aplicação de CATAFLAM EMULGEL, a menos que as mãos sejam a área em tratamento.

Não use CATAFLAM EMULGEL por mais de duas semanas. No caso do tratamento de artrites leves nos joelhos e dedos, o produto não deve ser utilizado por mais de 3 semanas, a menos que recomendado por um médico. Se os sintomas não melhorarem após 1 semana de uso ou se ficarem ainda piores, consulte um médico. Se você se esquecer de aplicar CATAFLAM EMULGEL aplique-o assim que possível e continue o tratamento normalmente. Se você se lembrar somente no momento da próxima aplicação, faça apenas uma aplicação, ou seja, não utilize uma quantidade em dobro do medicamento e continue o tratamento normalmente.

**SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR; NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS, PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.**

**NÃO USE O MEDICAMENTO COM O PRAZO DE VALIDADE VENCIDO. ANTES DE USAR OBSERVE O ASPECTO DO MEDICAMENTO.**

**Quais os males que este medicamento pode causar?**

CATAFLAM EMULGEL pode algumas vezes causar efeitos indesejáveis, como por exemplo:

- Mais comuns: coceira, vermelhidão, inchaço ou formação de bolhas na região tratada da pele.
- Muito raros: erupção cutânea generalizada; reações alérgicas tais como respiração ofegante, encurtamento da respiração ou inchaço da face.
- Muito raramente, CATAFLAM EMULGEL também pode causar aumento da sensibilidade da pele aos raios solares.

Se você apresentar estes sintomas ou outros efeitos indesejáveis não mencionados, pare de usar CATAFLAM EMULGEL e procure um médico imediatamente.

**O que fazer se alguém usar uma grande quantidade deste medicamento de uma vez só?**

CATAFLAM EMULGEL deve ser usado apenas externamente. Se houver ingestão acidental, procure um médico imediatamente.

**Onde e como deve guardar este medicamento?**

CATAFLAM EMULGEL deve ser mantido à temperatura ambiente (entre 15 e 30°C).

**TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.**

Reg. MS – 1.0068.0038

Farm. Resp.: Marco A. J. Siqueira – CRF-SP 23.873

Lote, data de fabricação e de validade: vide cartucho.

Fabricado por  
Novartis Pharma Produktions GmbH –  
Wehr, Baden – Alemanha

Importado por  
Novartis Biociências S.A.  
Av. Ibirama, 518 – Complexos 441/3  
Taboão da Serra – SP

CNPJ: 56.994.502/0098-62 – Indústria Brasileira

© Marca registrada de Novartis AG, Basileia, Suíça



2047267 – BR 903528

 **NOVARTIS**