

NEBACETIN®

sulfato de neomicina, bacitracina zínica

NYCOMED

Leia com atenção, antes de usar o produto.

Forma farmacêutica, via de administração e apresentações

Pomada. Bisnagas 15 g e 50 g. Uso tópico.

USO ADULTO OU PEDIÁTRICO

Composição

Cada grama da pomada contém:

Sulfato de neomicina*5 mg

*(equivalente a 3,5 mg de neomicina-base).

Bacitracina zínica.....250 U.I.

Excipiente q.s.p.....1 g

Excipientes: álcool cetílico, óleo mineral e petrolato branco.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

Como este medicamento funciona?

Nebacetin® contém dois antibióticos, a neomicina e a bacitracina zínica, que juntos inibem o crescimento de vários tipos de bactérias, principalmente as que costumam causar infecções de pele e de mucosas. Por isto, Nebacetin® é eficaz para tratar e para prevenir infecções de pele e de mucosas.

Os efeitos do Nebacetin® começam logo após sua aplicação. Na maioria dos casos, pode-se observar a melhora da lesão cerca de dois ou três dias após o início do tratamento. Contudo, a resposta ao tratamento depende, dentre outros fatores, do tamanho e tipo da lesão e da defesa do organismo do paciente. Caso não seja observada uma melhora, informe seu médico. Caso não seja observada uma melhora, informe seu médico.

Por que este medicamento foi indicado?

Nebacetin® está indicado para o tratamento de infecções da pele e/ou de mucosas, causadas por diferentes bactérias, como por exemplo, nas "dobras" da pele, ao redor dos pêlos, na parte de fora da orelha, nos furúnculos, nas lesões com pus, na acne infectada, nas feridas abertas (como úlceras na pele) e nas queimaduras de pele.

Nebacetin® também é indicado para prevenir infecções de pele e/ou de mucosas após ferimentos, cortes (inclusive de cirurgias) e queimaduras pequenas.

Quando não devo usar este medicamento?

Contra-indicações

Este medicamento não deve ser usado por pacientes que tenham alergia à neomicina, aos antibióticos aminoglicosídeos e outros componentes da fórmula. Também não deve ser usado nos casos de perda da função dos rins

(insuficiência renal grave) e quando o paciente já teve ou tem problemas de audição ou de equilíbrio (sistema labiríntico).

Advertências

Em algumas situações especiais, como nos pacientes com doenças neuromusculares (por exemplo, *Myasthenia gravis*) e naqueles que utilizam medicamentos relaxantes musculares ao mesmo tempo, o uso de Nebacetin® deve ser avaliado com cuidado pelo médico.

Pacientes que já usaram antibióticos aminoglicosídeos (por exemplo, a canamicina e/ou a estreptomicina) e aqueles que usam ao mesmo tempo Nebacetin® e outros antibióticos aminoglicosídeos, devem ser acompanhados pelo médico, pois pode haver uma maior chance de aparecerem efeitos colaterais.

Quando Nebacetin® é aplicado em grandes feridas na pele, pode haver uma maior absorção do medicamento para o sangue. Nos casos em que esta absorção é muito grande, e principalmente se o paciente já tem problemas na função dos rins, ou quando ele usa outros medicamentos que podem alterar a função dos rins ou a audição, podem ocorrer eventualmente problemas nos rins ou de audição.

Nebacetin® não deve ser usado nos olhos.

Precauções

Gravidez e lactação: este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica. Informe imediatamente seu médico em caso de suspeita de gravidez.

Este medicamento está contra-indicado para bebês prematuros, recém-nascidos e lactantes.

Pacientes idosos: não há restrições ou recomendações especiais com relação ao uso destes produtos por pacientes idosos.

Interações medicamentosas

Utilização juntamente com outras substâncias: deve-se evitar o uso simultâneo de outros medicamentos, tais como os antibióticos aminoglicosídeos, as cefalosporinas, a anfotericina B, a ciclosporina, o metoxiflurano e os diuréticos de alça, pela possibilidade de afetarem os rins e a audição. Os antibióticos aminoglicosídeos, como a neomicina, podem potencializar o efeito dos relaxantes musculares.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista o aparecimento de reações indesejáveis.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

Como devo usar este medicamento?

Aspecto físico

Nebacetin® é uma pomada translúcida de cor branca a levemente amarelada.

Características organolépticas

Nebacetin® possui odor característico.

Dosagem

Modo de usar

Aplicar sobre a região afetada uma fina camada do produto, 2 a 5 vezes ao dia com o auxílio de uma gaze.

O tratamento deve ser mantido por mais 2 a 3 dias, após os sintomas terem desaparecido.

Para que não ocorra um excesso da absorção do medicamento para o sangue, quando o Nebacetin® for aplicado em grandes áreas ou queimaduras, o tratamento deve ser feito por poucos dias (no máximo 8 a 10 dias).

Como usar

Antes de aplicar o produto, lavar a região afetada com água e sabão, e secar cuidadosamente o local. Depois da aplicação, pode-se proteger a região tratada com gaze.

Informações para abertura do lacre



Perfurar o lacre da bisnaga com o lado externo da tampa.

Leia com atenção o item “Modo de usar” para a utilização correta do produto.

Siga corretamente o modo de usar. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação médica ou de seu cirurgião-dentista.

Não use o medicamento com o prazo de validade vencido. Antes de usar observe o aspecto do medicamento.

Quais os males que este medicamento pode causar?

Reações alérgicas locais podem ocorrer em cerca de 1,5 % dos pacientes.

Quando o medicamento é utilizado de forma correta, geralmente não se espera nenhum efeito tóxico, pois a dose recomendada é baixa.

Porém, em alguns casos, quando o medicamento é usado em doses muito altas ou quando há um excesso da absorção de neomicina para o sangue, isto pode alterar a função dos rins, a audição

e/ou o equilíbrio (sistema labiríntico). Quando o paciente já tem alteração na função dos rins, há a possibilidade de ocorrer um acúmulo de antibióticos no sangue, que em alguns casos, afeta a audição.

Raramente ocorrem paralisias parciais dos músculos, sensação de “formigamento” e dores musculares.

O médico deve ser avisado quanto ao aparecimento dos seguintes sintomas: coceira, rash cutâneo, vermelhidão, inchaço ou quaisquer sintomas não notados anteriormente ao tratamento e perda auditiva (casos raros).

O que fazer se alguém usar uma grande quantidade deste medicamento de uma só vez?

É pouco provável que ocorra um quadro de intoxicação com o uso do Nebacetin®, quando as doses e a forma de aplicação são feitas de forma adequada. No entanto, caso o medicamento seja usado em quantidade excessiva, a região deve ser lavada imediatamente com água e sabão neutro, e seca com gaze ou pano limpo. Procurar assistência médica, caso apareçam reações indesejáveis.

Onde e como devo guardar este medicamento?

Conservar o produto na embalagem original e à temperatura ambiente (15°C a 30°C).

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

O prazo de validade está impresso na embalagem do produto.

MS – 1.0639.0252

Farmacêutico Responsável:

Wagner Moi – CRF-SP 14.828

N.º do lote, data da fabricação e data da validade: vide cartucho.

Sob licença de

Nycomed GmbH

Alemanha

Nycomed Pharma Ltda.

Rodovia SP 340 S/N, Km 133,5

Jaguariúna – SP

CNPJ 60.397.775/0008-40

Indústria Brasileira

NBPO_1003_0909

1033,100

Cód. Laetus: 159

150x210 mm

3
1 2 3

11 12
10
9
8
7

SANGAR
2010

EM CASO DE DÚVIDAS LIGUE GRATUITAMENTE

SAC: 0800-7710345

www.nycomed.com.br